،- نظام غذائكي قليل الدهون (2000 سعر حراري ، 1755 ملغم صوديوم ، 3055ملغم بوتاسيوم ، 1340 ملغم فسفور) :

- الفطور: نصف كوب حليب + 120 غم خبز أبيض + شرحات خضار طازجة (خيار ، خس ، فلفل حلو) + قطعة جبنة بيضاء حلوة (بحجم علبة الكبريت) + 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون .
 - وجبة خفيفة: نصف كوب ذرة + تفاحة .
 - الغداء: كوب ونصف خضار مطبوخة + كوب وثلث أرز مفلفل + فخذة دجاج (بدون جلد) .
 - وجبة خفيفة: حبة أجاص + نصف كوب بطاطا مسلوقة .
- العشاء: 2 رغيف خبز ابيض صغير + 2 ملعقة كبيرة لبنة + 2 ملعقة زيت زيتون صغيرة + نصف كوب لبن %3 دسم •



- تناول أي نوع من الأرز الأبيض مسموح بالكميات التي يحتاجها جسم المريض حوالي كوب إلى كوب إلى كوب ونصف ، لكن دون الخضار الموضوعة على الأرز .
 - ينصح بتقليل كمية المقلوبة والقدرة قدر الامكان لإحتوائها على كمية دهون وزيوت عالية .
 - استخدام طرق تقليل البوتاسيوم
- الابتعاد عن الخضار الورقية الخضراء جميعها مثل الملوخية والسبانخ والخبيزة ، لكن ممكن تناول الخس.
 - استبدال الأرز البني وخبز القمح بالأرز الأبيض والخبز الأبيض.
 - الابتعاد عن صلصة البندورة لإحتوائها على كمية كبيرة من البوتاسيوم .
 - تناول محاشي الباذنجان والكوسا بأي كمية بدون شوربة اللبن .
 - الابتعاد عن القلى قدر الإمكان.
 - تقليل كمية السوائل قدر الإمكان.
- يفضل تقطيع الخضار الى قطع صغيرة وسلقها ، ثم التخلص من ماء السلق للتخفيف من البوتاسيوم .
 - يفضل تناول صدر الدجاج بدل الفخدة .